

**Tabelle 4: Kurzzeitmorbidity: Gehirnblutungen (IVH), Frühgeborenen-Retinopathie (ROP) und nekrotisierende Enterokolitis (NEC) bei Früh- und Neugeborenen mit einem Geburtsgewicht <1500 g (in Absolutzahlen und in Prozent). Jahrgang 2010**

Gewichtsklasse	<500g		500 - 749g		750 - 999g		1000 - 1249g		1250 - 1499g		<1500g (Summe)	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Anzahl der Kinder	2		5		6		9		13		35	
Nicht sonographiert	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Keine IVH	1	50,0	3	60,0	4	66,7	8	88,9	13	100,0	29	82,9
IVH Grad 1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	11,1	0	0,0	1	2,9
IVH Grad 2	1	50,0	0	0,0	1	16,7	0	0,0	0	0,0	2	5,7
IVH Grad 3	0	0,0	2	40,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	5,7
IVH Grad 4	0	0,0	0	0,0	1	16,7	0	0,0	0	0,0	1	2,9
Fundus nicht untersucht	1	50,0	3	60,0	2	33,3	2	22,2	4	30,8	12	34,3
Retinopathie mit OP	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
NEC mit OP oder Verlegung	0	0,0	1	20,0	0	0	0	0,0	0	0	1	2,9
Entlassung nach Hause ohne ° zusätzl. Sauerstoffbedarf ° Operation einer NEC ° Laser- oder Kryo-therapie einer ROP	0	0,0	1	20,0	4	66,7	8	88,9	12	92,3	25	71,4

**Tabelle 4** bezieht sich auf alle im Berichtszeitraum Geborenen (auch die außerhalb des Perinatalzentrums Geborenen), im Perinatalzentrum behandelten und schließlich bis zum Berichtstermin (31. Mai des Folgejahres) nach Behandlung lebend entlassenen oder verlegten Kinder (Zeile 1= Anzahl der Kinder). Kinder, die nicht bis zum Berichtstermin entlassen oder verlegt wurden, werden nur in der kumulativen Ergebnisdarstellung aufgeführt. Die %-Zahl in Klammern bezieht sich auf die Anzahl der Kinder in der jeweiligen Gewichtsklasse. Dargestellt sind alle Blutungen, die während des (ersten) stationären Aufenthaltes diagnostiziert wurden.